

**SCHEMA SINTETICO DELLE NOTE CUF (28/4/99)**  
(CENTRO STUDI FIMMG ROMA : elaborazione D. Zamperini)

N.nota,classe, P.Attivi	Descrizione nota	R.Usl	P.T
<b>Nota 1:</b> Classe B <b>Misoprostolo</b>	<b>Prevenzione secondaria degli episodi di sanguinamento del tratto gastro-enterico superiore, in pazienti in trattamento cronico con FANS</b>		
<b>Nota 1. bis:</b> Classe B <b>Diclofenac + misoprostolo</b>	<b>Prevenzione secondaria degli episodi di sanguinamento del tratto gastroenterico superiore in pazienti che necessitano di trattamento cronico con diclofenac</b>		
<b>Nota 2:</b> Classe A <b>Acido ursodesossicoico, tauroursodesossicolico</b>	<b>Cirrosi biliare primitiva, colangite sclerosante primitiva, colestasi associata alla fibrosi cistica, colestasi intraepatica familiare pediatrica.</b>		
<b>Nota 2.bis:</b> Classe B <b>Ac. ursodesossicolico, chenodesossicolico</b>	<b>Calcolosi colesterinica.</b>  Calcoli singoli o multipli (diametro =< 1 cm) radiotrasparenti, che galleggiano durante colecistografia orale e con colecisti funzionante; pazienti non obesi con sintomatologia modesta (coliche non molto frequenti o severe). Altra indicazione è la presenza in colecisti di frammenti di calcoli post-litotrissia		
<b>Nota 3:</b> Classe B <b>Ac.cromoglicolico</b>	<b>Allergie alimentari.</b>  Diagnosi: 1) anamnesi ed attraverso diete di eliminazione e provocazione; 2) eventuale rilievo, con test cutanei e sierologici, di IgE specifiche per gli alimenti responsabili. Solo per trattamento preventivo.		
<b>Nota 5:</b> Classe A <b>Pancrelipasi</b>	<b>Pancreasectomia, pancreatite cronica, neoplasia pancreaticata con steatorrea.</b> Attività lipasica = o > a 5.000 USP/cps-cpr-conf-bust		
<b>Nota 8:</b> Classe A <b>Levocarnitina</b>	<b>Carenze primarie di carnitina</b> Solo confezioni orali da 2 g  Diagnosi: dosaggio della carnitina nel plasma o sul muscolo scheletrico, da riportare nel registro USL.	<b>O</b>	
<b>Nota 9:</b> Classe A <b>Ticlopidina</b>	<b>1) pazienti cui sia stato impiantato uno stent coronarico (per la durata di un mese); 2) pazienti che abbiano manifestazioni correlate ad interferenze da ASA con la ciclo-ossigenasi; 3) paz. che abbiano manifestato gastro-enterorragie durante il trattamento antiaggregante con ASA; 4) pazienti che presentino cerebropatie ischemiche recidivanti durante il trattamento con ASA.</b>  Per le ind. n. 2, 3 e 4, il farmaco è di 2a scelta rispetto all'ASA, limitatamente a pazienti necessitanti di terapia antiaggregante. La ticl. può essere responsabile di emorragie e di granulocitopenie. La corretta posologia è di 500 mgldie.	<b>O</b>  +  n. indicazione	
<b>Nota 10:</b> Classe A <b>Ac. Folico Cianocobalam. Idroxicobalamina</b>	<b>Trattamento delle anemie megaloblastiche da carenza documentata di vitamina B12 e di folati.</b>		
<b>Nota 11:</b> Classe A <b>Calcio folinato</b>	<b>1)"Rescue (recupero) dopo terapia con antagonisti dell'acido diidrofolico". 2) "Neoplasie del tubo digerente in associazione con 5 fluoro-uracile"</b>		

<p><b>Nota 12:</b> Classe A</p> <p><i>Epoetina alfa Epoetina beta</i></p>	<p><b>"Trattamento dell'anemia grave associata ad insufficienza renale cronica nei bambini e in pazienti adulti. Trattamento dell'anemia in pazienti oncologici in terapia a base di platino."</b> Consentito per: aumentare sangue autologo per predonazione evitando uso di sangue omologo; anemia moderata (Ht ca 33-39%, no carenza di ferro) se conservazione del sangue non disponibile o insufficiente in caso di: 1) interv. Elettivo di chirurgia maggiore che richieda elevato quantitativo di sangue (4 o più unità per le donne o 5 o più unità per gli uomini); 2) quando il periodo necessario per ottenere il quantitativo sufficiente di sangue autologo è troppo breve</p>	O	O
<p><b>Nota 13:</b> Classe A</p> <p><i>Fluvastatina, Pravastatina, Simvastatina, Atorvastatina, Cerivastatina</i></p>	<p><b>Ipercolesterolemie familiari.</b></p> <p>Nell'adulto, colesterolo totale =&gt; 290 mg/dL e/o colesterolo LDL =&gt; 200 mg/dL; - in età prepubere, colesterolo totale =&gt; 250 mg/dL e/o colesterolo LDL =&gt; 175 mg/dL. <u>Due determinazioni</u>, dopo almeno tre mesi di rigorosa dieta ed escluse le forme secondarie. <u>In aggiunta occorre almeno uno dei seguenti criteri aggiuntivi:</u> <b>1)</b> colesterolo totale =&gt;: 290 mg/dl e/o colesterolo LDL =&gt; 200 mg/dL in un parente di primo grado (genitori, figli, fratelli); in età prepubere, rispettivamente =&gt; 250 e =&gt;175 mg/dL; <b>2)</b> infarto miocardico e/o evento vascolare maggiore in altri distretti, nel paziente o in un parente di primo grado (genitori, figli, fratelli), prima dei 55 anni nell'uomo e dei 60 nella donna; <b>3)</b> xantomatosi tendinea; <b>4)</b> Documentazione di alterazioni recettoriali su base genetica. L'indicazione è estesa, limitatamente alla PRAVASTATINA e alla SIMVASTATINA, a pazienti che iniziano la terapia prima dei 75 anni con documentato pregresso infarto miocardico o pregresso intervento di rivascularizzazione miocardica ( bypass o angioplastica coronarica) in presenza di valori di colesterolemia totale superiore a 210 mg/dl o di colesterolemia LDL superiore a 130 mg/dl riscontrati dopo almeno tre mesi di dieta</p>		
<p><b>Nota 14:</b> Classe A</p> <p><i>Bezafibrato, Fenofibrato, Gemfibrozil, Simifibrato</i></p>	<p><b>Iperlipidemie familiari.</b></p> <p>Triglic. plasmatici a digiuno &gt; 250 mg/dL, isolati o associati ad elevati livelli di colest. LDL (&gt; 175 mg/dL). <u>Due determinazioni</u>, dopo tre mesi di dieta ed escluso le forme secondarie. <u>Inoltre almeno uno dei seguenti criteri aggiuntivi:</u> <b>1.</b> 'iperlipidemia in almeno un parente di primo grado (genitori, figli, fratelli); <b>2.</b> infarto miocardico e/o evento vascolare maggiore in altri distretti, nel paziente o in un parente di primo arado (genitori, figli, fratelli), prima dei 55 anni nell'uomo e dei 60 nella donna; <b>3.</b> xantomatosi eruttiva; <b>4.</b> pancreaticiti recidivanti in pazienti iperlipemici che iniziano la terapia prima dei 75 anni.</p>		
<p><b>Nota 15:</b> Classe A</p> <p><i>Albumina umana</i></p>	<p><b>In singole somministrazioni o in brevi cicli per: ipoalbuminemia con concentrazione plasmatica = o &lt; a 2,5 g/dL, se associata a grave ritenzione idrosalina non responsiva a un trattamento diuretico appropriato o dopo paracentesi con estrazione di &gt; 4 L. di liquido ascitico nella cirrosi.</b> Riportare nel Reg. USL la diagnosi, l'indicazione alla somministrazione e il valore di albuminemia. Da non utilizzare come supporto nutrizionale in pazienti in terapia enterale o parenterale, nei pazienti con enteropatie proteinodisperdenti, proteinuria da malnutrizione o malassorbimento</p>	O	
<p><b>Nota 21:</b> Classe A</p> <p><i>Isotretinoina</i></p>	<p><b>Forme acneiche di particolare gravità, di tipo nodulo-cistico o conglobato.</b> Farmaco riservato a pazienti con acne nodulare grave non rispondenti alla terapia convenzionale compresi gli antibiotici sistemici.</p>		
<p><b>Nota 28:</b> Classe A</p> <p><i>Gestonorone, Medrossi- progesterone, Megestrol</i></p>	<p><b>Carcinoma dell'endometrio, della mammella, della prostata e del rene, sindrome anoressia/cachessia da neoplasia maligna e da AIDS in fase avanzata.</b></p>		
<p><b>Nota 30:</b> Classe A</p> <p><i>Filgrastim, Lenograstim, Molgramostim</i></p>	<p><b>Neutropenie congenite o da chemioterapia, trapianto di midollo osseo,</b></p>	O	O
<p><b>Nota 31:</b> Classe A</p> <p><i>Levodropizina, Dimemorano</i></p>	<p><b>Tosse nella tubercolosi polmonare attiva e nelle neoplasie polmonari primitive e secondarie.</b></p>		

<p><b>Nota 32</b> : Classe A</p> <p><b>Interferoni</b></p>	<p>1) I. alfa-2a e alfa-2b ricomb.i; epatite cronica B, C e D; leuc. a cellule capellute;leuc. mieloide cronica; sarcoma di Kaposi correlato all'AIDS o altre gravi immunodepressioni; linfoma non Hodgkin follicolare. 2) Solo I. alfa-2a ricombinante: anche carcin. renale avanzato; linfoma cutaneo a cell. T. 3) Solo I. alfa-2b ricombinante: anche mieloma multiplo; melanoma maligno; tumore carcinoide.</p>	O	O
<p><b>Nota 33</b>: Classe A</p> <p><b>Interferon beta (naturale)</b></p>	<p>L.imitatamente a pazienti già in trattamento per le indicazioni Epatite cronica attiva B, C e D .</p> <p>*Tutti gli intreferoni necessitano di Reg. USL e P.Terapeutico)</p>	*	*
<p><b>Nota 34</b>: Classe A*</p> <p><b>Desogestrel + Etinilestradiolo;</b> <b>Gestodene + Etinilestradiolo;</b> <b>Levonorgestrel + Etinilestradiolo;</b> <b>Norgestrel + Etinilestradiolo</b></p>	<p>Mestruazioni irregolari e/o abbondanti con perdita di ferro. *In classe B per tutte le altre indicazioni</p>		
<p><b>Nota 36</b>: Classe A</p> <p><b>Fluoximesterone, Metil testosterone, Testosterone</b></p>	<p><b>Ipogonadismi maschili primitivi e secondari; pubertà ritardata</b></p>		O
<p><b>Nota 37</b></p>	<p>Farmaci con duplice via di distribuzione.</p>		
<p><b>Nota 39</b>: Classe A</p> <p><b>Somatropina</b></p>	<p>Bassa statura da deficit di Gh, S. di Turner, deficit staturale in I.R.C., Adulti con GH &lt; 3 mcg/l dopo stimolo. I livelli di GH vanno riportati nel Reg. UsI</p>	O	O
<p><b>Nota 40</b>: Classe A</p> <p><b>Lanreotide, Octreotide</b></p>	<p><b>Acromegalia, apudomi</b></p>	O	O
<p><b>Nota 41</b>: Classe A</p> <p><b>Calcitonina sint. di salmone, anguilla, umana , Elcatonina</b></p>	<p><b>Limitatamente alle fiale per: morbo di Paget</b></p>	O	
<p><b>Nota 42</b>: Classe A</p> <p><b>Ac. clodronico, Ac. etidronico</b></p>	<p>Limitatamente alla somministrazione parenterale nel morbo di Paget e inoltre nelle lesioni osteolitiche da metastasi ossee e da mieloma multiplo</p>	O	
<p><b>Nota 48</b>: Classe A</p> <p><b>Anti- H2</b></p> <p><b>Inibitori di Pompa.</b></p>	<p><b>A) Trattamento di 4 settimane (occasionalmente 6 settim.): ulcera duoden. o gastrica positive per Helicobacter pylori; per la prima o per le prime 2 settimane in associaz. con farmaci eradicanti l'infezione; gastrite cronica severa, istologicamente documentata, associata a dispepsia similulcerosa persistente da almeno 6 mesi; primo episodio di ulcera duodenale o gastrica Helicobacter pylori negative; primo episodio di malattia da reflusso gastroesofageo. B) durata di trattamento prolungata: s.di Zolliger Ellison; ulcera duoden. o gastrica recidivante, mal. da reflusso gastroesofageo recidivante, con esofagite endoscopicamente documentata alla prima indicazione o alla prima recidiva.</b></p>		
<p><b>Nota 49</b>: Classe A*</p> <p><b>Tetracosactide</b></p>	<p><b>Epilessia infantile: forme miocloniche, sindromi di West e di Lennoux-Gastaut.</b> *Classe B per tutte le altre indicazioni.</p>		
<p><b>Nota 50</b></p>	<p>Nota da considerare riferita a tutti i vaccini collocati nella classe C.</p>		

<p><b>Nota 51:</b> Classe A</p> <p><i>Buserelina, Goserelina Leuprorelina , Triptorelina</i></p>	<p>Carcinoma della mammella e della prostata; endometriosi; fibromi uterini non operabili; pubertà precoce. Trattamento prechirurgico negli interventi di miomectomia e isterectomia per la durata di 3 mesi nella paziente metrorragica; trattamento prechirurgico negli interventi di ablazione endometriale e di resezione di setti endouterini per via endoscopica. L'uso nelle endometriosi dovrebbe essere limitato a sei mesi per il rischio di osteoporosi.</p>	O	O
<p><b>Nota 52 :</b> Classe A</p> <p><i>Interferone alfa naturale)</i></p>	<p><b>Epatite cronica attiva B, C e D; leucemia a cellule capellute; carcinoma renale, leucemia mieloide cronica</b></p>	O	O
<p><b>Nota 53:</b> Classe A</p> <p><i>Levamisolo</i></p>	<p><b>Cancro del colon-retto, in associazione con 5 fluorouracile</b></p>		
<p><b>Nota 54:</b> Classe A</p> <p><i>Clonazepam (Rivotril os gtt), Diazepam (Ansiolin im iv; Tranquiril os gtt)</i></p>	<p><b>Sindromi epilettiche, convulsioni febbrili. Solo confezioni in gocce e fiale</b></p>		
<p><b>Nota 55</b> Classe A</p> <p><i>Carbencillina, Cefepime, Cefodizima, Cefoperazone, Cefprozima, Ceftriaxone, Cefotaxima, Ceftazidima, Mezlocillina, Piperacillina, Piperacillina + tazobactam, Ticarcillina + acido clavulanico</i></p>	<p>Trattamento iniettivo di infezioni gravi respiratorie, urinarie, intraaddominali, della cute e annessi, ossee e articolari e nelle setticemie causate da microrganismi difficili resistenti ai piu' comuni antibiotici, particolarmente nei pazienti defedati o immunocompromessi</p>		
<p><b>Nota 55 bis:</b> Classe A</p> <p><i>Amikacina , Netilmicina, Tobramicina, Gentamicina</i></p>	<p>Gravi infezioni da microrganismi difficili resistenti ai più comuni antibiotici, particolarmente nei pazienti defedati immunocompressi</p>		
<p><b>Nota 56 :</b> Classe A</p> <p><i>Aztreonam, Imipenem+Cilastina, Meropenem, Rifabutina, Teicoplanina.</i></p>	<p><b>Trattamento prescritto in ambiente ospedaliero</b></p>	O	O
<p><b>Nota 57:</b> Classe A</p> <p><i>Granisetron, Ondansetron, Tropisetron</i></p>	<p><b>Antiemetico, in pazienti in corso di trattamenti antitumorali altamente emetizzanti</b></p>		
<p><b>Nota 58</b></p>	<p>L'uso terapeutico dell'ossigeno liquido e gassoso è a carico del SSN</p>		
<p><b>Nota 59:</b> Classe A</p> <p><i>Lattitolo, Lattulosio</i></p>	<p><b>Encefalopatia porto-sistemica in corso di cirrosi epatica</b></p>	O	
<p><b>Nota 61:</b> Classe A</p> <p><i>Interferone alfa naturale (leucocitario n-3)</i></p>	<p><b>Epatite cronica attiva B, C e Delta; leucemia a cellule capellute; carcinoma renale.</b></p>	O	O
<p><b>Nota 63:</b> Classe A</p> <p><i>Alfantrina (Halfan)</i></p>	<p><b>Trattamento di malaria resistente alla cloroquina</b></p>		

<p><b>Nota 65:</b> Classe A</p> <p><i>Interferone beta-1b ricombinante, Interferone beta-1a ricombinante</i></p>	<p><b>Sclerosi multipla recidivante-remittente nei soli pazienti con punteggio di invalidità compreso tra 1 e 3,5 all'EDSS di Kurtzke con inizio della terapia tra i 16 e i 50 anni. <u>Prescrizione e dispensazione riservata a Centri Ospedalieri autorizzati</u></b></p>		
<p><b>Nota 66:</b> Classe A</p> <p><b>Tutti i FANS</b></p>	<p><b>Artropatie su base connettivica, attacco acuto di gotta, osteoartrosi in fase algica o infiammatoria; dolore neoplastico lieve o moderato, eventualmente in associazione con gli oppiacei nel dolore neoplastico severo.</b></p>		
<p><b>Nota 67:</b> Classe A</p> <p><i>Lamotrigina, Gabapentin, Felbamato, Vigabatrin</i></p>	<p><b>Prescrizione limitata ai pazienti resistenti ai comuni antiepilettici</b></p>		
<p><b>Nota 69 :</b>Classe A <i>Ranitidina + Bismuto citrato.</i></p>	<p><b>Trattamento per 2-4 settimane dell'ulcera peptica Helicobacter pylori positiva in associazione con altri farmaci eradicanti</b></p> <p>- non efficace da solo: per eradicaz. HP si richiede associaz. con antibiotici;</p> <p>- non indicato in: dispepsie, reflusso gastroesofageo, nelle rare ulcere HP-negative, ove non occorre bismuto;</p> <p>- uso non oltre le 8 settimane. Non superare due cicli di 8 settimane in un anno.</p>		
<p><b>Nota 70:</b> Classe A</p> <p><i>Cabergolina</i></p>	<p><b>Patol. iperprolattinemiche da adenomi ipofis. secernenti prolattina in paz. reistenti e/o intolleranti al trattamento con farmaci agonisti dopaminergici</b></p>		
<p><b>Nota 71:</b> Classe A</p> <p><i>Clozapina</i></p>	<p><b>Schizofrenia resistente o intollerante ai tradizionali antipsicotici</b></p>		O
<p><b>Nota 71 bis:</b> Classe A: <i>Risperidone</i></p>	<p><b>Pazienti schizofrenici già in trattamento con clozapina, ma che presentino sintomi obiettivabili e documentati di tossicità alla clozapina stessa</b></p>		O
<p><b>Nota 72:</b> Classe A</p> <p><i>Dornase alfa</i></p>	<p><b>Fibrosi cistica</b></p>		O
<p><b>Nota 73:</b> Classe A</p> <p><i>Tutti i sartanici:</i></p>	<p><b>Pazienti che devono sospendere il trattamento con un ACE-inibitore a causa di una tosse persistente o angioedema.</b></p>		
<p><b>Nota 74:</b> Classe A</p> <p><i>Urofolitropina</i></p>	<p><b>Trattamento dell'infertilità femminile. Classe A anche per il trattamento dell'infertilità maschile per l'induzione della spermatogenesi in caso di ipogonadismo ipogonadotropo.</b></p>	O	O
<p><b>Nota 75:</b> Classe A</p> <p><i>Alprostadil (Caverject)</i></p>	<p><b>limitatamente a soggetti medullolesi</b></p>		
<p><b>Nota 76:</b> Classe A</p> <p><i>Gluconato ferroso e Ferro polistirensulfonato</i></p>	<p><b>limitatamente ai bambini nei primi tre anni di vita, alle donne in gravidanza e agli anziani</b></p>		
<p><b>Nota 77:</b> Classe A</p> <p><i>Biotina</i></p>	<p><b>1) Sindrome da carenza congenita di biotinidasi; 2) Sindrome da insuff. congenita multipla delle carbossilasi</b></p>	O	

<p><b>Nota 78:</b> Classe A</p> <p><i>Dorzolamide</i></p>	<p><b>Pazienti che non rispondono ai beta-bloccanti o in cui i beta-bloccanti siano controindicati.</b></p>		
<p><b>Nota 79:</b> Classe A</p> <p><i>Alendronato di Sodio.</i></p>	<p><b>Trattamento continuativo per almeno un anno per la profilassi di fratture osteoporotiche in donne con fratture di femore o di almeno un corpo vertebrale non dovute a traumatismi efficienti, verificatesi dopo la menopausa.</b> La frattura di un corpo vertebrale deve essere documentata da un esame radiologico che evidenzi una riduzione di almeno 4 mm (15%) dell'altezza globale del corpo vertebrale</p>	<p><b>O</b></p>	
<p><b>NOTA 80:</b> Classe A</p> <p><i>Venlafaxina cloridrato.</i></p> <p><i>Fluoxetina cloridrato</i></p> <p><i>Citalopram bromidrato</i></p> <p><i>Paroxetina cloridrato.</i></p> <p><i>Sertralina cloridrato.</i></p> <p><i>Fluvoxamina maleato.</i></p>	<p><b>Limitatamente ai pazienti nei quali l'uso degli antidepressivi triciclici e' controindicato per una delle seguenti condizioni cliniche:</b></p> <p><u>ipersensibilita' gia' nota a questi farmaci; glaucoma; ipertrofia prostatica e altre alterazioni stenose dell'apparato urinario; stenosi pilorica e altre alterazioni stenose del tratto gastroenterico; cardiopatie con rischio di aritmie ventricolari; periodo di recupero post-infartuale.</u></p>		
<p><b>NOTA 81:</b> Classe A</p> <p><i>Dalteparina sodica</i></p> <p><i>Enoxaparina sodica.</i></p> <p><i>Nadroparina calcica.</i></p> <p><i>Reviparina sodica.</i></p> <p><i>Tinzaparina sodica.</i></p>	<p><b>Classe A – limitatamente ai seguenti impieghi:</b></p> <p><b>Trattamento:</b> pazienti con trombosi venosa profonda prossimale, durante la prima fase del trattamento e la messa a punto del dosaggio efficace di un anticoagulante cumarinico. <b>Profilassi:</b> pazienti con alto rischio di trombosi venosa profonda prossimale e di embolia polmonare;</p> <p><b>Definizione di alto rischio:</b> chirurgia ortopedica maggiore del femore o del ginocchio; chirurgia pelvica o addominale maggiore per tumori; precedenti trombosi venose profonde o embolia polmonare; precedente trombocitopenia da eparina non frazionata.</p>		

Le specialità previste nelle Note sono prescrivibili a carico del SSN (come previsto dalla Note stesse) purché le patologie ivi indicate risultino tra quelle per cui è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio.

**Nel "Registro USL" (da attivare "in modo vincolante" dal medico che effettua la diagnosi o inizia il trattamento) occorre riportare sulla scheda: 1) la patologia per la quale il farmaco viene prescritto; 2) - il dosaggio e la durata del trattamento, eventuali modalità di somministrazione (piano terapeutico); 3) - la data di formulazione della diagnosi.**

P.T.= Piano terapeutico

**FARE SEMPRE RIFERIMENTO AL TESTO COMPLETO**